

CELERI

Apium Graveolens

Rave, à côte ou à couper

Culture

Distance d'isolement entre 2 variétés : 400 m à 1 km en fonction de l'environnement et des barrières naturelles (haies, bois, etc.) ; ou en cas de risques :

- Protection sous voile anti-insecte avec mini-ruchette ou ouverture alternative entre plusieurs variétés.
- Isolation : ne produire qu'une variété semencière par an.

Du semis à la récolte des graines : env. 18 mois
Période de récolte approximative : août/septembre

Informations générales

Cycle : Bisannuelle

Reproduction : Partiellement allogame

Degré de fécondation croisée : 10-30%

Fécondation : Insectes

Dépression de consanguinité : Quasi-nulle

Nombre mini de porte-graines : 15

Estimation de production : 35g/pied

Espacement conseillé (sur planche 1,2m) :
2 rg x 50 cm

Semences

Durée germinative : 8 ans (possible 10 ans)

Récolte et processus d'extraction

Plante bisannuelle :

Mise en jauge avec un maximum de racines.

Repiquage dès le retour des beaux jours (dès mars si possible). Un buttage du pied pourra permettre de maintenir le céleri en place. Arrosage généreux.

Récolte des graines : dès que les graines brunissent et le plant jauni. **Ne récolter que les ombelles primaires**

On peut finir de sécher sur un drap ou tissu dans un endroit ventilé à l'ombre.

Battage des ombelles dans un sac ou un seau.

Critères de Sélection du réseau

Grosueur

Forme

Sensibilité à creuser